

**Kinder oder Jugendliche mit COVID-19
kompatiblen Symptomen***

>10 Jahre → Testen lt. Verdachtsfalldefinition, bei positivem Resultat: Absonderung und Kontaktpersonennachverfolgung lt. behördlichen Vorgaben

mit Fieber (Körpertemp. $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$) **≤10 Jahre** ohne Fieber (Körpertemp. $< 38,0^{\circ}\text{C}$)

Kontakt zu einem bestätigten Fall ODER wohnt mit einer Person, die zu einer Risikogruppe*** gehört

Nein Ja

RisikopatientInnen** ≤10 Jahre mit COVID-19 kompatiblen Symptomen* sowie PatientInnen, die im Krankenhaus aufgenommen werden, sollten großzügig getestet werden.

Plausible Alternativdiagnose

Ja Nein

PCR Testung

Ja

Kontakt zu einem bestätigten Fall ODER wohnt mit einer Person, die zu einer Risikogruppe*** gehört

Nein

zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome

Negativ

Positiv

Absonderung UND Kontaktpersonennachverfolgung lt. behördlichen Vorgaben ODER falls kein Kontakt zu einem bestätigten Fall, zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome

Absonderung UND Kontaktpersonennachverfolgung lt. behördlichen Vorgaben

zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome (ausgenommen isolierte Rhinorrhoe)

* ≤10a: Akuter Infekt der oberen oder unteren Atemwege, Pharyngitis, non purulente Konjunktivitis, Erbrechen und Durchfall, plötzlich aufgetretene Anosmie und Ageusie
>10a: siehe Falldefinition der BMSGPK (<https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html>)
** Schwere Lungen- oder Herzerkrankungen, PatientInnen unter Chemotherapie, schwere neuromuskuläre Erkrankungen, immunsupprimierte PatientInnen, Adipositas Grad II und III
*** Laut Empfehlung des Sozialministeriums (www.sozialministerium.at)